


Vermoeden van tuberculose?

Verwijs de cliënt door voor een gratis longfoto en/of tuberculinehuidtest. Je kan hiervoor terecht in een VRGT-centrum in de buurt.

ANTWERPEN	antwerpen@vrgt.be
BRUSSEL	brussel@vrgt.be
GENT	gent@vrgt.be
HASSELT	hasselt@vrgt.be
KORTRIJK	kortrijk@vrgt.be
LEUVEN	leuven@vrgt.be
OOSTENDE	oostende@vrgt.be
TURNHOUT	turnhout@vrgt.be

Liever telefonisch contact?

Bel één van onze verpleegkundigen. De telefoonnummers vind je hier:



Wat doen wij?

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw zet binnen haar tuberculosewerking in op:

contactonderzoek

therapiebegeleiding

opleiding en vorming

epidemiologische opvolging

screening en opsporing risicogroepen

Meer weten over onze werking?
Surf naar www.vrgt.be.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:



Volg ons op sociale media



Hulpverlener,
blijf alert voor
tuberculose

VRGT

Wist je dat...

Tuberculose wereldwijd **opnieuw de dodelijkste infectieziekte** is? Ook in ons land komt het nog steeds voor, al zijn de cijfers wel dalende.

Zo maak jij het verschil

Als hulpverlener ken je misschien mensen die meer risico hebben op tuberculose.

Een eenvoudige screening bij hen is aangewezen.

Hoe sneller je denkt aan tuberculose, hoe kleiner de impact is voor de zorgvrager en de omgeving (gezin, contacten,...). **Blijf dus alert voor de ziekte en contacteer ons** bij een vermoeden of vragen.

Kan je besmet raken?

Besmetting gebeurt via de lucht. De meest voorkomende vorm is longtuberculose. Als iemand met deze vorm hoest, niest, lacht, of zelfs praat komen bacteriën vrij in de lucht. Door het inademen hiervan kunnen andere personen geïnfecteerd worden.

De kans op besmetting neemt toe naarmate men langer (uren) in dezelfde ruimte is, en als deze niet verlucht en verlicht is. Een **goede ventilatie en zonlicht (UV-stralen) binnenlaten** zijn enkele preventie maatregelen.

Waarop moet je letten?

Symptomen



chronisch hoesten



algemeen onwel voelen



nachtzweeten



koorts



vermageren



verminderde eetlust



pijn in de borstkas

Risicofactoren

verzwakte immuniteit

afkomstig van of recent in hoog risicoland

contact met besmettelijke tuberculosepatiënt

armoede (dakloos, drugmisbruik, geen inkomen,...)

voorgeschiedenis van niet of slecht behandelde tuberculose

Samen staan we sterker!



Wij helpen je adequaat handelen als hulpverlener.

Contacteer ons vrijblijvend voor:

- Een **infosessie** bij jou op kantoor over tuberculose en de werking van de VRGT.
- Een doorgedreven **vorming** voor zorgverleners die frequent in contact komen met risicogroepen voor tuberculose. We bespreken onder andere ziekteleer, diagnostiek en preventie.
- Een **e-learning** waarin jouw algemene kennis wordt aangescherpt. Wil je graag deelnemen in groep? Dat kan ook! Stuur een mailtje naar info@vrgt.be.