

## WAS IST EINE UMGEBUNGSUNTERSUCHUNG?

Personen im Umfeld eines infizierten Patienten werden untersucht, um festzustellen, ob sie vom Kranken angesteckt wurden oder vielleicht selbst erkrankt sind. Das geschieht anhand eines **Tuberkulin-Hauttests** oder einer **Röntgenaufnahme der Lunge**.

Personen aus dem Umfeld eines Kranken werden auch untersucht, um die Infektionsquelle zu entdecken.



## MÖCHTEN SIE MEHR WISSEN?

Besuchen Sie Ihren Arzt.

Setzen Sie sich in Verbindung mit [www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be) oder kontaktieren Sie die Agentur "Zorg en Gezondheid" in Ihrer Provinz:

- \ Antwerpen: 03 224 62 04
- \ Limburg: 011 74 22 40
- \ Ostflandern: 09 276 13 80
- \ Flämisch-Brabant: 016 66 63 50
- \ Westflandern: 050 24 79 00

Setzen Sie sich in Verbindung mit [www.vrgt.be](http://www.vrgt.be) oder kontaktieren Sie die "Vlaamse Vereniging voor Respiratoire gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding" (Flämischen Verein für respiratorische Gesundheitsfürsorge und für die Bekämpfung von Tuberkulose (VRGT) in Ihrer Provinz:

- \ Antwerpen:  
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburg: 011 22 10 33
- \ Ostflandern: 09 225 22 58
- \ Flämisch-Brabant: 016 33 25 25
- \ Westflandern: 059 70 26 85

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL  
[www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be)



Vlaanderen  
is zorg

Verantw. Herausg.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

## TUBERKULIN-HAUTTEST

zum Nachweis von Tuberkulose


AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID

Ein Tuberkulin-Hauttest (Mantoux-Test oder Intrakutantest) zeigt an, ob Sie mit dem Tuberkulose-Erreger, auch als (Koch'scher) Tuberkelbazillus bezeichnet, infiziert sind. Die Bakterie verursacht Tuberkulose. Am häufigsten befällt die Krankheit die Lungen, manchmal aber auch Nieren, Knochen, Gehirn, Drüsen oder andere Organe.

## WIE WIRD DER TEST DURCHFÜHRT?

Eine kleine Flüssigkeitsmenge (Tuberkulin) wird unter die Haut am Unterarm injiziert. Einige Tage nach dem Test wird das Ergebnis abgelesen.

Der Tuberkulin-Hauttest ist nicht gefährlich und kann auch bei Kleinkindern oder schwangeren Frauen durchgeführt werden.



## DAS ERGEBNIS IST NEGATIV

Wenn bei der Kontrolle des Testergebnisses **keine klare Reaktion** auf dem Arm abgelesen werden kann, sind Sie höchstwahrscheinlich nicht vom Tuberkulose-Erreger infiziert worden.

Manchmal muss nach zwei Monaten eine Kontrolluntersuchung gemacht werden.

## DAS ERGEBNIS IST NICHT EINDEUTIG

Wenn bei der Kontrolle eine **kleine und blasse Schwellung** auf dem Arm spürbar ist, ist es nicht deutlich, ob Sie infiziert worden sind oder nicht.

Wenn Ungewissheit über das Testergebnis herrscht, muss es immer wiederholt werden (meistens nach zwei Monaten).

## DAS ERGEBNIS IST POSITIV

Wenn bei der Kontrolle **eine deutliche Schwellung und Verhärtung** der Haut spürbar ist, sind Sie infiziert.

Bei einem positiven Tuberkulin-Hauttest muss eine Röntgenaufnahme der Lungen gemacht werden, damit untersucht wird, ob Sie Tuberkulose entwickelt haben. Ist diese Lungenaufnahme normal, liegt eine Infektion vor, aber Sie sind weder erkrankt noch ansteckend für andere.

In bestimmten Fällen ist es ratsam, sechs bis neun Monate lang ein Arzneimittel zu nehmen. Auf diese Weise lässt sich das Risiko, eine Tuberkulose zu entwickeln, um etwa 80% senken.

Sollte die Lungenaufnahme für die Tuberkulose typische Schädigungen aufweisen, müssen Sie mit einer Behandlung anfangen. Dann müssen Sie mindestens sechs Monate lang sehr pünktlich drei oder mehr Arzneimittel nehmen.

## POSITIVER TUBERKULIN-HAUTTEST

