



Vlaanderen
is zorg

آيا تاسو لا زيات معلومات غواړئ؟



د خپل طبيب سره خبرې وکړئ. آيا تاسو لا زيات معلومات غواړئ؟

د خپل ولايت کي www.zorg-en-gezondheid.be وگورئ يا په خپل ولايت کي
"Zorg en Gezondheid" اژانس سره اړيکي ونيسي:

انتورپ: 03 224 62 04 \

ليمبرگ: 011 74 22 40 \

شرقي فليندرز: 09 276 13 80 \

فليميش بريانت: 016 66 63 50 \

غربي فليندرز: 050 24 79 00 \

www.vrgt.be وگورئ يا په خپل ولايت کي د فليميش "Vereniging
voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding"
(د نري رنځ او سگي د روغتيا پاملرنې مؤسسه) (VRGT) سره اړيکي
ونيسي:

انتورپ: \

برچيم: 03 287 80 10 - ترنهاوت 014 41 13 62 \

ليمبرگ: 011 22 10 33 \

شرقي فليندرز: 09 225 22 58 \

فليميش بريانت: 016 33 25 25 \

غربي فليندرز: 059 70 26 85 \

ريسپ. اېډ. 11/2014 - Agenschap Zorg en Gezondheid - Dirk Dewolf

نري رنځ

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID



Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
BRUSSEL 1030
www.zorg-en-gezondheid.be

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.



اړيکي څنگه او ولي ترسره شوي

هغه خلک چي د ساري نري رنځ لرونکيو ناروغانو په شاوخوا کي وي د هغوي څيرنه کيږي چي وکتل شي آيا دغه کس ته د ناروغه کس د ناروغی سرابت شوی يا هغوي په خپله ناروغه دي. په دغه څيرنه کي د نري رنځ د پوستکي ازموينه يا د سيني ايکس رى يا دواړه شامل دي.

د ناروغه کس په شاوخوا کي اوسيدونکي کسان بايد وڅيرل شي چي د سرابت سرچينه معلومه شي. د رنځور کس سره سم، نرس بايد د هغه کسانو يو لست جوړ کړي د کومو سره چي هغه د تيرو څو مياشتو په ترڅ کي په اړيکو کي ويا وه: د کورنۍ غړي، دوستان، د کار ملگري، د ټولگي ملگري، د يوې مؤسسې يا د تفريحي کلوب غړي.

نری رنځ یو ساري ناروغي ده چې لامل یې تیوبرکل بیسیلیس یا کوچي بیسیلیس دي. په عام ډول دا د سږو د نري رنځ صورت اختیاري، دغه ناروغي کله کله په پښتورگو، هډوکو، مغزو، گلینډز یا نورو اعضاء اغیز کوي.

نری رنځ باید چا ته ولگي؟

نری رنځ هر یو کس ته کیدای شي. خو بیا هم، تنکي ځوانان او هغه خلک چې کمزوری مقاومت لري په آسانی د دې قرباني کیدای شي.

آیا د نري رنځ درملنه کیدای شي؟

هو، د دغې ناروغي درملنه په بشپړه ډول کیدای شي. درملنه په عام ډول په درې یا څلور قسمة درملو شمول کوي (انتي بائیوتک).

دغه انتي بائیوتک باید لږ تر لږه شپږو میاشتو لپاره استعمال شي ځکه چې دغه بیکتیریا رنگول مشکل وي. درملنه په صحي ډول نه تعقیبول بیا پخواني حالت ته د ستندیدو لامل کیدای شي. دا احتمال شتون لري چې درملنه ډېره مشکل شي کله چې بیکتیریا عام انتي بائیوتک ته مقاومتی شي.

د دې نښې نښانې څه دي؟

د سږي د فعال نري رنځ تر ټولو عامې نښانې دي:

- په تکرار سره توخی، اکثر د بلغم سره
- د اشتها کمیدل
- د وزن کمیدل
- د سینې درد
- (لوره) تبه
- د شپې په وخت خوله راتلل
- ستوماني

تاسو ته سرایت څه رنگه کیږي؟

نری رنځ په عام ډول تل د باد له لاري خپریږي. تیوبرکل بیسیلی په باد کې خپریږي کله چې د سږو په نري رنځ کې مبتلا کس توخیري، خبري کوي یا پرنجی کوي. شاوخوا کې موجود کسان باید دغه بیکتیریا د سا اخیستلو سره دننه کړي. که بیکتیریا په سږو کې داخل شي، دا د معمولي سرایت لامل ګرځي کوم چې په عام ډول په خپله رغیږي خو په ځینې کسانو کې دا باید وړاندې خپاره شي.

تاسو د نورو خلکو لپاره کله ساري یاست؟

تاسو ساري یاست کله چې تیوبرکل بیسیلی ستاسو په بلغم کې ښکاره شي. (ساري د سږو نری رنځ). په هغه پېښو کې چې تیوبرکل بیسیلی په نظر نه راځي، دغه ناروغي ته غیر ساري د سږو نری رنځ ویل کیږي. په کوم بل عضو کې د نري رنځ سرایت (د سږو څخه بهر) ساري نه دی.

کله چې تاسو د څو اونیو لپاره په ښه ډول درملنه تعقیبئ، توخی او ساریتوب کمیږي، خو ناروغي لا تر اوسه تداوي شوي نه وي. د توخي مناسب نظافت هم نورو ته د خپرېدو خطر کموي: تاسو باید تل خپل لاس خلي ته نیولو او له نورو خلکو مخ اړولو سره د کاغذ په تښو کې توخی وکړئ. دغه تښو د فضله موادو په ټوکرې کې وغورځوئ او لاس په اوبو او مایع صابن سره ومینځئ.

دغه ټول شکایات باید په یو وخت ښکاره نشي. ځینې خلک باید په دې کې هیڅ یو شکایت نه لري، خو بیا هم کیدای شي په نري رنځ اخته وي.

دغه بیکتیریا په وینه یا لامپیتیک رګونو کې هم خپرېدی شي تر څو نورو اعضاء ته ورسې (پښتورګي، هډوکي، مغزه، گلینډز...) نری رنځ چیرې هم د شیانو له لاري نه خپریږي (چارې، کالي، کتابونه، کټ ځادري...)

