

آیا مایلید بیشتر بدانید؟



بررسی تماس چیست؟

افرادی که در مجاورت بیمار مبتلا به سل ریوی واگیردار هستند، باید معاینه شوند تا مشخص گردد آیا توسط بیمار آلوده شده‌اند یا اینکه آیا خودشان بیمار هستند یا خیر. بررسی شامل انجام آزمایش پوستی سل یا عکسبرداری اشعه ایکس از قفسه سینه است.

همچنین افرادی که در مجاورت بیمار قرار دارند باید بررسی شوند تا منبع عفونت کشف شوند.

با پزشکتان صحبت کنید

به وبسایت www.zorg-en-gezondheid.be مراجعه کنید یا با سازمان "Zorg en Gezondheid" در استان خود تماس بگیرید:

- ۱ آنتورپ: ۰۳ ۲۲۴ ۶۲ ۰۴
- ۱ لیمبورگ: ۰۱۱ ۲۲ ۷۴ ۴۰
- ۱ فلاندرز شرقی: ۰۹ ۲۷۶ ۱۳ ۸۰
- ۱ فلمیش برابانت: ۰۱۶ ۶۶ ۶۳ ۵۰
- ۱ فلاندرز غربی: ۰۵۰ ۲۴ ۷۹ ۰۰

از وبسایت www.vrgt.be بازدید کنید یا با "Vereniging voor" "Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding" (انجمن مراقبت‌های بهداشتی تنفسی و سل) در استان خود تماس بگیرید:

- ۱ آنتورپ:
- برخ: ۰۳ ۲۸۷ ۸۰ ۱۰ - ترنهوت: ۰۱۴ ۴۱ ۱۳ ۶۲
- ۱ لیمبورگ: ۰۱۱ ۲۲ ۱۰ ۳۳
- ۱ فلاندرز شرقی: ۰۹ ۲۲۵ ۲۲ ۵۸
- ۱ فلمیش برابانت: ۰۱۶ ۳۳ ۲۵ ۲۵
- ۱ فلاندرز غربی: ۰۵۹ ۷۰ ۲۶ ۸۵

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg



آزمایش پوستی سل

برای تشخیص سل


AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID



در موارد خاص توصیه می‌شود به مدت شش تا نه ماه دارو مصرف کنید، به این ترتیب خطر ابتلا به سل حدود ۸۰٪ کاهش می‌یابد.

در صورتی که عکس اشعه ایکس قفسه سینه ضایعات سل را نشان دهد، لازم است درمان را آغاز کنید. لازم است سه محصول دارویی یا بیشتر به‌طور منظم و به مدت حداقل شش ماه مصرف شود.

آزمایش پوستی سل مثبت



نتیجه منفی است

اگر نتیجه آزمایش واکنش مشخصی را روی بازویتان نشان ندهد، به‌طور کلی بدان معنی است که احتمالاً به باسیل توبرکل آلوده نیستید.

گاهی اوقات لازم است باید پس از دو ماه آزمایش کنترل انجام شود.

نتیجه نامعلوم است

اگر واکنش ناحیه برآمده کوچکی روی بازویتان باشد که رنگ‌پریده باشد، مشخص نیست که آیا آلوده شده‌اید یا خیر.

وقتی در مورد نتیجه عدم اطمینان وجود داشته باشد، آزمایش باید مجدداً انجام شود (معمولاً بعد از دو ماه).

نتیجه مثبت است

اگر واکنش به شکل ناحیه برآمده سفت پوست باشد، این بدان معناست که میتلا شده‌اید.

در صورتی که نتیجه آزمایش پوستی سل مثبت باشد، باید عکس اشعه ایکس قفسه سینه تهیه شود تا مشخص گردد آیا سل ایجاد شده است یا خیر. اگر اشعه ایکس عادی باشد، شما میتلا هستید اما بیمار نیستید و بیماری‌تان برای دیگران مسری نیست.

آزمایش پوستی سل (آزمایش مانتو یا آزمایش داخل پوستی) برای مشخص شدن اینکه آیا به باسیل توبرکل (باسیل کخ) که باعث سل می‌شود مبتلا هستید یا خیر انجام می‌شود. این بیماری که معمولاً به شکل سل ریوی پدیدار می‌شود، گاهی اوقات کلیه‌ها، استخوان‌ها، مغز، غدد و سایر اندام‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

آزمایش چطور انجام می‌شود؟

مقدار اندکی مایع (توبرکولین) به داخل پوست ساعد فرد تزریق می‌شود. نتیجه چند روز پس از آزمایش بررسی می‌شود.

آزمایش پوستی سل خطرناک نیست و می‌توان آن را بر روی کودکان یا زنان باردار نیز انجام داد.

