

## CO TO JEST BADANIE OSÓB, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z CHORYMI?

Osoby z otoczenia pacjenta z zakaźną gruźlicą płucną są badane w celu sprawdzenia, czy doszło do zakażenia przez pacjenta lub czy same są chore. Badanie obejmuje **skórną próbę tuberkulinową lub zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej.**

Osoby z otoczenia pacjenta również muszą być zbadane, aby wykryć źródło zakażenia.



## CZY CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Porozmawiaj ze swoim lekarzem.

Odwiądź stronę [www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be) lub skontaktuj się z agencją „Zorg en Gezondheid” w swojej prowincji:

- \ Antwerpia: 03 224 62 04
- \ Limburg: 011 74 22 40
- \ Flandria Wschodnia: 09 276 13 80
- \ Brabancja Flamandzka: 016 66 63 50
- \ Flandria Zachodnia: 050 24 79 00

Odwiądź stronę [www.vrgt.be](http://www.vrgt.be) lub skontaktuj się z flamandzkim stowarzyszeniem VRGT „Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding” (Stowarzyszenie ds. Zdrowia Układu Oddechowego i Gruźlicy) (VRGT) w swojej prowincji:

- \ Antwerpia:  
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburg: 011 22 10 33
- \ Flandria Wschodnia: 09 225 22 58
- \ Brabancja Flamandzka: 016 33 25 25
- \ Flandria Zachodnia: 059 70 26 85

Wydawca odp.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL  
[www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be)



Vlaanderen  
is zorg

## SKÓRNA PRÓBA TUBERKULINOWA

w celu wykrycia gruźlicy

AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID

Skórną próbę tuberkulinową (test Mantoux lub śródskórny) wykonuje się, aby sprawdzić, czy pacjent jest zakażony prątkami gruźlicy (Kocha), które wywołują gruźlicę. Choroba najczęściej występuje w formie gruźlicy płucnej, lecz czasami atakuje także nerki, kości, mózg, gruczoły i inne organy.

## JAK PRZEBIEGA PRÓBA?

Małą ilość płynu (tuberkuliny) wstrzykuje się do skóry przedramienia pacjenta. Wynik kontroluje się po upływie kilku dni po przeprowadzeniu próby.

Skórną próbę tuberkulinową nie jest groźna i można ją wykonywać u małych dzieci oraz kobiet w ciąży.



## WYNIK JEST UJEMNY

Jeśli kontrola wyniku próby **nie wykazuje wyraźnej reakcji** na ramieniu, zwykle to oznacza, że pacjent prawdopodobnie nie jest zakażony prątkami gruźlicy.

Czasami konieczne jest wykonanie próby kontrolnej po dwóch miesiącach.

## WYNIK JEST NIEPEWNY

Jeśli reakcją jest **mała wypukłość** na ramieniu o bladym zabarwieniu, to wynik nie pozwala stwierdzić, czy pacjent jest lub nie jest zakażony.

W przypadku jakiegokolwiek niepewności wyniku zawsze należy powtórzyć próbę (zwykle po dwóch miesiącach).

## WYNIK JEST DODATNI

Jeśli reakcją jest **twarda wypukłość na skórze**, to pacjent jest zakażony.

W przypadku dodatniej skórnej próby tuberkulinowej wykonuje się **zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej** pacjenta, aby sprawdzić rozwój gruźlicy. Jeśli zdjęcie wygląda normalnie, pacjent jest zakażony, lecz nie jest chory i nie zaraża innych osób.

W pewnych przypadkach zaleca się przyjmowanie jednego leku przez sześć do dziewięciu miesięcy, co ogranicza ryzyko późniejszego rozwoju gruźlicy o około 80%.

Jeśli zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej ujawni zmiany gruźlicze, pacjent musi rozpocząć leczenie. Konieczne jest wtedy bardzo regularne przyjmowanie trzech lub więcej produktów leczniczych przez co najmniej sześć miesięcy.

## DODATNIA SKÓRNA PRÓBA TUBERKULINOWA

