

## O QUE É UMA INVESTIGAÇÃO DE CONTACTO?

As pessoas que se encontrem na proximidade de um doente com tuberculose pulmonar contagiosa são examinadas para verificar se foram infetadas pelo doente ou se estão doentes. A investigação envolve uma **prova cutânea da tuberculina** ou uma **radiografia torácica**.

As pessoas próximas de um doente também têm de ser examinadas para descobrir a fonte da infeção.



## DESEJA SABER MAIS?

Fale com o seu médico.

Visite [www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be) ou contacte a agência “Zorg en Gezondheid” na sua província:

- \ Antuérpia: 03 224 62 04
- \ Limburgo: 011 74 22 40
- \ Flandres oriental: 09 276 13 80
- \ Brabante flamengo: 016 66 63 50
- \ Flandres ocidental: 050 24 79 00

Visite [www.vrgt.be](http://www.vrgt.be) ou contacte a “Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding” flamenga (Associação para Cuidados de Saúde Respiratórios e Tuberculose) (VRGT) na sua província:

- \ Antuérpia:  
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburgo: 011 22 10 33
- \ Flandres oriental: 09 225 22 58
- \ Brabante flamengo: 016 33 25 25
- \ Flandres ocidental: 059 70 26 85

Resp. ed.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid  
Koning Albert II-laan 35 bus 33  
1030 BRUSSEL  
[www.zorg-en-gezondheid.be](http://www.zorg-en-gezondheid.be)



Vlaanderen  
is zorg

# PROVA CUTÂNEA DA TUBERCULINA

para a deteção da tuberculose

AGENTSCHAP  
ZORG & GEZONDHEID

Uma prova cutânea da tuberculina (prova de Mantoux ou teste intradérmico) é realizada para verificar se está infetado com o bacilo da tuberculose (bacilo de Koch), que causa a tuberculose. Assumindo frequentemente a forma de tuberculose pulmonar, a doença também afeta por vezes os rins, ossos, cérebro, glândulas e outros órgãos.

## COMO É REALIZADA A PROVA?

Uma pequena quantidade de fluido (tuberculina) é injetada na pele do antebraço da pessoa. O resultado é verificado dois dias depois da prova.

A prova cutânea da tuberculina não é perigosa e também pode ser realizada em crianças pequenas ou mulheres grávidas.



## O RESULTADO É NEGATIVO

Se a verificação do resultado da prova **não mostrar uma reação evidente** no seu braço, isto significa, por norma, que não estará infetado com o bacilo da tuberculose.

Por vezes, tem de ser realizado um teste de controlo dois meses depois.

## O RESULTADO É INCERTO

Se a reação for uma **pequena área elevada** de cor pálida no braço, não se sabe ao certo se está ou não infetado.

Quando existe alguma incerteza acerca do resultado, a prova terá sempre de ser repetida (geralmente passados dois meses).

## O RESULTADO É POSITIVO

Se a reação assumir a forma de **uma área rígida e elevada na pele**, significa que há infeção.

No caso de uma prova cutânea da tuberculina positiva, terá de ser submetido a uma **radiografia torácica** para verificar se tem tuberculose. Se a radiografia estiver normal, apesar de estar infetado, não está doente nem corre o risco de contagiar outras pessoas.

Em alguns casos, é aconselhável tomar um medicamento durante seis a nove meses, reduzindo assim, em cerca de 80%, o risco de desenvolvimento de tuberculose numa fase posterior.

Se a radiografia torácica revelar lesões tuberculosas, terá de iniciar o tratamento. Será então necessário tomar três ou mais medicamentos, com muita regularidade, durante pelo menos seis meses.

## PROVA CUTÂNEA DA TUBERCULINA POSITIVA

