

CE ÎNSEAMNĂ INVESTIGAREA PERSOANELOR DE CONTACT?

Sunt examinați oamenii din anturajul unui pacient cu tuberculoză pulmonară contagioasă pentru a afla dacă aceștia au fost infectați de pacient sau dacă ei înșiși sunt bolnavi. Investigația cuprinde un **test cutanat la tuberculină sau o radiografie toracică**.

Oamenii din anturajul unui pacient trebuie de asemenea examinați pentru a descoperi sursa de infecție



DORIȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE INFORMAȚII?

Adresați-vă medicului dumneavoastră.

Accesați www.zorg-en-gezondheid.be sau contactați agenția „Zorg en Gezondheid” din regiunea dumneavoastră:

- \ Anvers: 03 224 62 04
- \ Limburg: 011 74 22 40
- \ Flandra de Est: 09 276 13 80
- \ Brabantul Flamand: 016 66 63 50
- \ Flandra de Vest: 050 24 79 00

Accesați www.vrgt.be sau luați legătura cu „Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding” (Asociația flamandă de asistență medicală pentru bolile respiratorii și tuberculoză) (VRGT) din regiunea dumneavoastră:

- \ Anvers:
Berchem: 03 287 80 10 – Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburg: 011 22 10 33
- \ Flandra de Est: 09 225 22 58
- \ Brabantul Flamand: 016 33 25 25
- \ Flandra de Vest: 059 70 26 85

Resp. ed.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid – 12/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg



TEST CUTANAT LA TUBERCULINĂ

pentru detectarea tuberculozei

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Testul cutanat la tuberculină (testul Mantoux sau testul intradermic) se efectuează pentru a afla dacă sunteți infectat cu bacilul tuberculos (bacilul Koch) care cauzează tuberculoza. Boala care de obicei apare în forma tuberculozei pulmonare afectează uneori și rinichii, oasele, creierul, glandele și alte organe.

CUM SE EFECTUEAZĂ TESTUL?

Se injectează o mică cantitate de fluid (tuberculină) în pielea antebrațului unei persoane. Rezultatul este verificat cu două zile după efectuarea testului.

Testul cutanat la tuberculină nu este periculos și poate fi efectuat și pe copii mici sau femei însărcinate.



REZULTATUL ESTE NEGATIV

Dacă verificarea rezultatului testului **nu arată o reacție clară** pe brațul dumneavoastră acest lucru înseamnă în general că probabil nu sunteți infectat cu bacilul tuberculos.

Uneori trebuie efectuat și un test de control după două luni.

REZULTATUL ESTE INCERT

Dacă reacția este o **umflătură mică**, palidă de culoare pe brațul dumneavoastră, nu este clar dacă sunteți infectat sau nu.

Când există o incertitudine în privința rezultatului, testul întotdeauna trebuie efectuat din nou (de obicei după două luni).

REZULTATUL ESTE POZITIV

Dacă reacția ia forma **unei umflături tari a pielii**, acest lucru înseamnă că sunteți infectat.

În cazul unui test cutanat pozitiv la tuberculină, trebuie să efectuați o **radiografie toracică** pentru a afla dacă s-a dezvoltat tuberculoza. Dacă radiografia este normală, atunci sunteți infectat, dar nu sunteți bolnav, și nici contagios pentru alții.

În anumite cazuri se recomandă să luați un medicament pentru șase – nouă luni, reducând astfel cu circa 80% riscul de a dezvolta tuberculoză mai târziu.

Dacă radiografia toracică indică leziuni tuberculoase, va trebui să începeți un tratament. Trebuie să luați cu regularitate trei sau mai multe medicamente cel puțin șase luni.

TEST CUTANAT POZITIV LA TUBERCULINĂ

