

TEMAS İNCELEMESİ NEDİR?

Bulaşıcı akciğer tüberkülozu görülen hastanın çevresindeki bireyler, hastadan enfeksiyon kapıp kapmadıklarının veya kendilerinin hasta olup olmadıklarının anlaşılması için incelemeden geçirilir. Bu inceleme kapsamında **tüberkülin deri testi yapılır veya göğüs röntgeni çekilir**.

Hasta olan kişinin çevresindeki bireyler ayrıca enfeksiyon kaynağının belirlenmesi için de incelemeden geçirilmelidir.



DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İSTER MİSİNİZ?

Doktorunuzla görüşebilirsiniz.

www.zorg-en-gezondheid.be adresini ziyaret edebilir veya bölgenizdeki "Zorg en Gezondheid" acentesiyle iletişime geçebilirsiniz.

- \ Antwerp: 03 224 62 04
- \ Limburg: 011 74 22 40
- \ Doğu Flandre: 09 276 13 80
- \ Flaman Brabant: 016 66 63 50
- \ Batı Flandre: 050 24 79 00

www.vrgt.be adresini ziyaret edebilir veya bölgenizde hizmet veren Flaman "Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding" (Solunum Sağlığı Hizmetleri ve Tüberküloz Derneği) (VRGT) ile iletişime geçebilirsiniz.

- \ Antwerp:
Berchem: 03 287 80 10 - Turnhout: 014 41 13 62
- \ Limburg: 011 22 10 33
- \ Doğu Flandre: 09 225 22 58
- \ Flaman Brabant: 016 33 25 25
- \ Batı Flandre: 059 70 26 85

Sorumlu editör: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg

Tüberkülozun tespit edilmesine yönelik

TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Tüberküloza neden olan tüberküloz basilinin (Koch basili) size bulaşıp bulaşmadığını anlamak için tüberkülin deri testi (Mantoux testi ya da intradermal test) yapılır. Yaygın olarak akciğer tüberkülozu şeklinde görülen hastalık bazen böbrekleri, kemikleri, beyni, salgı bezlerini ve diğer organları da etkiler.

TEST NASIL YAPILIR?

Kişinin önkol derisine **az miktarda sıvı (tüberkülin)** enjekte edilir. Sonuç, testten birkaç gün sonra kontrol edilir.

Tüberkülin deri testi tehlikeli değildir; küçük çocuklara ya da hamile kadınlara da uygulanabilir.

SONUCUN NEGATİF OLMASI

Genellikle, test sonucu kontrol edildiği sırada **kolunuzda net bir reaksiyon görülüyorsa**, muhtemelen size tüberküloz basili bulaşmamış demektir.

Bazen aradan iki ay geçtikten sonra kontrol amaçlı bir test yapılması gerekebilir.

SONUCUN BELİRSİZ OLMASI

Reaksiyon kolunuzda **küçük bir alanın şişmesi** ve soluk renk alması şeklindeyse, enfekte olup olmadığınız net değildir.

Sonuçla ilgili herhangi bir belirsizlik olduğu takdirde, test mutlaka tekrar edilmelidir (genellikle aradan iki ay geçtikten sonra).

SONUCUN POZİTİF OLMASI

Reaksiyon sonucunda **cildinizde bir bölge şişip sertleşiyorsa**, hastalık size bulaşmış demektir.

Tüberkülin deri testinin pozitif olması halinde tüberkülozun ilerleyip ilerlemediğinin anlaşılması için **göğüs röntgeni** çektirmeniz gerekir. Röntgenin normal olması, hastalığın bulaştığını ancak hasta ya da hastalığı başkalarına bulaştıracak durumda olmadığını gösterir.

Bazı durumlarda daha sonra tüberküloz gelişmesine ilişkin riskin yaklaşık %80 oranında azaltılması için bir ilacın altı ila dokuz ay süreyle kullanılması tavsiye edilebilir.

Göğüs röntgeninde tüberküloz lezyonları görüldüğü takdirde, tedaviye başlamanız gerekir. Bu durumda üç veya daha fazla tıbbi ürünün en az altı ay süreyle son derece düzenli şekilde kullanılması gereklidir.

POZİTİF TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ

