

Blijf alert voor tuberculose

chronisch hoesten

■
vermageren

■
nachtszweeten

■
koorts

■
algemene malaise

■
thoraxpijn

Meer info op WWW.VRGT.BE

T 02 510 60 90

Verwijs naar de VRGT voor screening

ANTWERPEN | Leopoldstraat 26 | T 03 287 80 10

BRUSSEL | Hoogstraat 322 | T 02 411 94 76

GENT | Baudelokaai 8 | T 09 225 22 58

HASSELT | Stadsomvaart 7 | T 011 22 10 33

LEUVEN | Kapucijnenvoer 33 | T 016 33 25 25

OOSTENDE | Kairostraat 84 | T 0490 442 646

TURNHOUT | Eigenaarsstraat 21 | T 014 41 13 62



Preventieve opsporing bij vermoeden van latente tuberculose infectie:

- Mantoux-test of tuberculinehuidtest (THT)
- een positieve THT wordt gevolgd door een RX-thorax voor de detectie van reeds ontwikkelde actieve tuberculose



Bij vermoeden van actieve tuberculose:

- verwijst naar VRGT voor RX-thorax
- een THT is niet aangewezen (een negatieve THT sluit ziekte niet uit)



Bij bevestigde actieve tuberculose:

- verwijst naar de longarts
- meld de ziekte bij het Agentschap Zorg en Gezondheid die het contactonderzoek verder coördineert
WWW.ZORG-EN-GEZONDHEID.BE

- In België worden 4 op 5 tuberculosegevallen vastgesteld in de eerstelijnszorg
- In de huisartsenpraktijk is dit gemiddeld 1 casus in 15 jaar
- In arme stedelijke gebieden kan de trefkans verhogen tot 7 gevallen in 15 jaar

WWW.VRGT.BE

T 02 510 60 90

Risicofactoren

armoede

- ernstig kansarmen
- dak- en thuislozen
- IV-druggebruikers
- ex-gedetineerden
- vluchtelingen en asielzoekers

verzwakte immuniteit

- hoge leeftijd
- HIV
- IV-druggebruik
- alcoholabusus
- TNF- α blokkers
- transplant
- dialyse
- maligniteit

personen die in contact kwamen met besmettelijke tuberculosepatiënten

personen die recent in een risicoland waren

- landen uit Azië, Afrika en voormalige Sovjet-Unie

oud-tuberculosepatiënten of personen met laesies/sequellen op de longfoto