

Blijf alert voor tuberculose



Contacteer de VRGT

ANTWERPEN	03 287 80 10
BRUSSEL	02 411 94 76
LEUVEN	016 79 09 92
GENT	09 225 22 58
HASSELT	011 22 10 33
TURNHOUT	014 41 13 62
OOSTENDE	05 979 00 00
KORTRIJK	05 979 00 00



Blijf alert voor tuberculose

Neem TB op in de differentiaal diagnose

- 4 op 5 tuberculosegevallen worden vastgesteld in de eerstelijnszorg
- gemiddeld 1 casus in 15 jaar in de huisartsenpraktijk
- de trefkans verhoogt tot 7 gevallen in 15 jaar in arme stedelijke gebieden

Symptomen



chronisch hoesten



vermageren



algemene malaise



koorts



nachtzweeten



thoraxpijn

Risicogroepen



Risicofactoren

- **verzwakte immuniteit**
- **alcoholabusus**
- **hoge leeftijd**
- **TNF- α blokkers**
- **HIV**
- **transplant**
- **IV-druggebruik**
- **dialyse**
- **diabetes**
- **maligniteit**

Besliskundige acties

Bij vermoeden van latente tuberculose infectie

- Mantoux-test of tuberculinehuidtest (THT)
- een positieve THT wordt gevolgd door een RX-thorax voor de detectie van reeds ontwikkelde actieve tuberculose

Bij vermoeden van actieve tuberculose

- verwijs naar VRGT voor RX-thorax
- een THT is niet aangewezen (een negatieve THT sluit ziekte niet uit)

Bij bevestigde actieve tuberculose

- verwijs naar de longarts
- meld de ziekte bij het Agentschap Zorg en Gezondheid die het contactonderzoek verder coördineert www.zorg-en-gezondheid.be