



Vlaanderen
is zorg



ماذا يعني التحقق من الاحتكاك والتلامس؟

يتم فحص الأشخاص القريبين من شخص مصاب بالسل الرئوي للتحقق من مدى إصابتهم من اللذين يعانون من السل أو لمعرفة ماذا إذا كانوا أنفسهم/مرضى. وتشمل عملية التحقق هذه إجراء الاختبار الجلدي بالتوبركولين و أو أشعة الصدر.

ينبغي فحص الأشخاص الذين هم على تماس متكرر بشخص مصاب لاكتشاف مصدر الإصابة.

إذا كنت بحاجة الى المزيد من المعلومات فعليك الاتصال بطبيبك أو بمراقبة الصحة العامة أو الجمعية الفلمنكية للرعاية الصحية للجهاز (VRGT) التنفسي والسل.

مراقبة الصحة العامة

- \ أنتورب: 03 224 62 04
- \ ليمبورغ: 011 74 22 40
- \ برابات الفلمنكية: 016 66 63 50
- \ شرق فلاندرن: 09 276 13 80
- \ غرب فلاندرن: 050 24 79 00

www.zorg-en-gezondheid.be

الجمعية الفلمنكية للرعاية الصحية للجهاز التنفسي والسل

- \ أنتورب: 03 287 80 10 - 014 41 13 62
- \ ليمبورغ: 011 22 10 33
- \ برابات الفلمنكية: 016 33 25 25
- \ شرق فلاندرن: 09 225 22 58
- \ غرب فلاندرن: 059 70 26 85

www.vrgt.be

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

الاختبار الجلدي بالتوبركولين

AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

النتيجة سلبية

يُنصح في بعض الحالات تناول الدواء لمدة 6-9 أشهر، إذ أن هذا يقلل من خطر الإصابة بالسل فيما بعد بنسبة 80٪.

إذا أظهرت أشعة اكس آفات السل ، فعليك الشروع في العلاج. يجب تناول ثلاثة أو أكثر من المنتجات الطبية بانتظام لمدة ستة أشهر على الأقل.

إذا أخفقت نتيجة الاختبار في إظهار رد فعل واضح على ذراعك فان هذا عموماً يعني انك لست مصاباً بعصية مرض السل.

يتوجب بعض الأحيان مراقبة الاختبار بعد شهرين.

النتيجة غير مؤكدة

قد يكون رد الفعل عبارة عن انتفاخ صغير بلون شاحب.

عندما يكون هناك أدنى شك حول الاختبار يتوجب القيام به من جديد (بشكل عام بعد شهرين).

النتيجة إيجابية

إذا كان رد الفعل عبارة عن انتفاخ صغير وصلب في منطقة الذراع ، فان هذا يعني انك أصبت عن طريق شخص مصاب بالسل.

عندما تكون نتيجة الاختبار بالتوبركولين إيجابية ، فانك بحاجة الى أخذ اشعة ، أكس للصدر للتأكد من وجود السل.إذا لم تظهر الأشعة أي شيء غير عادي فهذا يعني انك مصاب ولكنك لست مريضاً وانك غير مُعد للآخرين.

يتم إجراء الاختبار الجلدي بالتوبركولين (اختبار مانتو أو اختبار دولي) لإظهار إذا ما كان الشخص مصاباً بعصية التدرن الرئوي (عصية كوتش) التي تسبب مرض السل. وبشكل عام فان المرض الذي يأخذ شكل السل الرئوي يؤثر بعض الأحيان على الكليتين ، العظام، الدماغ، الغدد والأعضاء الأخرى.

كيف يتم إجراء الاختبار الجلدي بالتوبركولين؟

يتم زرق كمية صغيرة من سائل (التوبركولين) في بشرة ذراع الشخص . يتم التحقق من النتائج بعد 3 إلى 5 أيام من تاريخ الاختبار.

ان الاختبار الجلدي بالتوبركولين غير خطر ويمكن إجراءه على الأطفال أو الحوامل.



إختبار جلدي بالتوبركولين إيجابي

