



КАК И ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ?

Лица, находящиеся в контакте больным открытой формой туберкулеза, должны быть обследованы, чтобы исключить их заражение от больного палочкой Коха или заболевание туберкулезом. Обследование включает кожный туберкулиновый тест и/или флюорографию органов грудной клетки.

Лица, составляющие ближайшее окружение, должны быть обследованы также и с целью выявления возможного источника инфекции.

Медсестра опрашивает больного и составляет список лиц, находившихся в тесном контакте с ним в течение последних нескольких месяцев: членов семьи, друзей, коллег по работе, одноклассников, членов клубов и обществ, часто посещаемых больным.



За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему врачу.

Визит www.zorg-en-gezondheid.be или контакт Уход и Здоровье в провинции:

- \ Антверпен: 03 224 62 04
- \ Лимбург: 011 74 22 40
- \ Оост-Влаандерен: 09 276 13 80
- \ Влаамс-Брабан: 016 66 63 50
- \ Вест-Влаандерен: 050 24 79 00

Визит www.vrgt.be или контакт Фламандской ассоциации по борьбе с туберкулезом и заболеваниями дыхательных путей (ФАБТЗДП) в провинции:

- \ Антверпен:
Берхем: 03 287 80 10 - Турнхют: 014 41 13 62
- \ Лимбург: 011 22 10 33
- \ Оост-Влаандерен: 09 225 22 58
- \ Влаамс-Брабан: 016 33 25 25
- \ Вест-Влаандерен: 059 70 26 85

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 11/2014

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be



Vlaanderen
is zorg



ТУБЕРКУЛЕЗ


AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

Туберкулез (сокращенно Тбс) инфекционное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой, или палочкой Коха. Наиболее распространен туберкулез легких, однако иногда болезнь поражает почки, кости, мозг, лимфоузлы и другие органы.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?

Туберкулез практически всегда передается воздушно-капельным путем. Туберкулезные палочки выделяются больными открытой формой туберкулеза легких при кашле, чихании и разговоре. Находящиеся рядом люди могут вдыхать эти бактерии. Попадая в легкие, бактерии вызывают легкую форму заболевания, которая в большинстве случаев проходит без вмешательства врачей. Однако в ряде случаев она может развиваться в активную форму болезни. По кровеносным и лимфатическим сосудам бактерии могут проникать в другие органы (почки, кости, головной мозг, лимфоузлы...)

Туберкулез практически никогда не передается через предметы обихода: одежду, столовые приборы, книги, постельное белье...



КТО МОЖЕТ ЗАРАЗИТЬСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?


Заразиться туберкулезом может любой человек, однако маленькие дети и лица со сниженным иммунитетом более восприимчивы к возбудителю заболевания

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА?

Наиболее распространенными симптомами туберкулеза являются :

- непроходящий кашель, часто с выделением слизистой мокроты
- потеря аппетита
- снижение веса
- боль в груди
- ночная потливость
- повышенная утомляемость

В некоторых случаях у больных проявляются лишь некоторые из перечисленных симптомов, более того, пациент может не находить у себя ни одного из этих симптомов, но, тем не менее, болеть туберкулезом.



ИЗЛЕЧИМ ЛИ ТУБЕРКУЛЕЗ?

Да, эта болезнь полностью излечима. Лечение обычно включает в себя прием трех или четырех лекарственных препаратов (т.н. туберкулостатических средств).

Т.к. туберкулезные палочки очень трудно уничтожить, данные препараты необходимо регулярно принимать не менее 6 месяцев. Несоблюдение схемы лечения может привести к обострению болезни или развитию бактерий, резистентных к принимаемым препаратам.

КОГДА БОЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРАЗНЫМ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ?

Больной заразен, если палочка Коха обнаруживается в его мокроте (т.н. открытый туберкулез легких). Человек с закрытой формой туберкулеза легких, а также с туберкулезным поражением других органов (не легких) обычно не заразен.

Если больной четко следует рекомендациям врача в течение нескольких недель, кашель снижается, и он становится менее заразным, но пока еще не здоровым. Правильная гигиена кашля также помогает снизить риск заражения окружающих. Больной должен при кашле использовать одноразовый носовой платок и поворачивать лицо в направлении от других людей.