


TUBERCULOSE IN BELGIË

EVOLUTIE VAN TUBERCULOSE IN BELGIË

In 2018 werden **981** nieuwe **tuberculosegevallen** gemeld. De incidentie, het aantal zieken per 100.000 inwoners, is daarmee 8,6.

België maakt deel uit van de «landen met lage incidentie», met minder dan 10 gevallen per 100.000 inwoners per jaar. De incidentie is wel nog steeds hoger dan in de buurlanden.




Source: ECDC 2019


Tuberculose kan eender wie treffen maar komt vaker voor bij mensen uit landen met een hoge incidentie

Ondanks schommelende waarden vertoont **België** nog steeds een **dalende incidentie**.


Sinds de jaren 90 daalt de incidentie minder dan verwacht: de geobserveerde waarden liggen hoger dan de voorspelde waarden. De laatste jaren stagneert de incidentie rond 9 per 100.000 inwoners.



GEOGRAFISCHE VERSPREIDING




Tuberculose komt vaker voor in de grote steden omdat men daar een hogere concentratie vindt van risicogroepen (kansarmen, daklozen, mensen uit hoge incidentielanden)





De ziekte neemt langzaam af in de Belgische bevolking maar fluctueert bij niet-Belgen.

Bij Belgen was de incidentie **4,7**/100.000 inwoners in 2018. Bij personen met een niet-Belgische nationaliteit, voornamelijk uit landen waar tuberculose nog endemisch is, ligt dit cijfer **8 keer hoger**.

PROFIEL VAN DE TUBERCULOSEPATIËNT




- ▶ Bij de Belgische populatie is de incidentie relatief evenredig verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen, behalve bij de groep kinderen die minder getroffen wordt en bij de groep 75 plussers bij wie TB vaker voorkomt.
- ▶ Bij de niet-Belgen bevindt de piek zich bij de **jongvolwassenen**. Daarna neemt de incidentie af naarmate de leeftijd stijgt.




- ▶ De grootste risicogroep bestaat uit personen die tijdens de laatste 2 jaar **contact** hadden met een besmettelijke persoon.
- ▶ 10% van de gevallen zijn **mensen zonder papieren** waarvan de meerderheid zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt.
- ▶ Het percentage **dak-en thuislozen** is het hoogst ooit waargenomen sinds de dataverzameling. Drie kwart verblijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor bepaalde bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen op tuberculose zijn specifieke maatregelen voorzien. Desondanks moeten er extra maatregelen genomen worden om de «hard-to-reach» groepen te bereiken.

Tuberculose komt hoofdzakelijk voor in de longen maar de ziekte kan ook elk ander orgaan aantasten.



Meer dan 2/3e van de gevallen tast de longen aan. Een deel daarvan ontwikkelt eveneens **extrapulmonale** tuberculose. 78% van de **pulmonale** gevallen werd bevestigd met bacteriologie (cultuur positief). Bij iets minder dan de helft van de gevallen (42%) waren er bacteriën zichtbaar in het sputum (onder de microscoop) wat duidt op een grotere besmettelijkheid.




monoresistentie 6%
Bij 6% van de personen met tuberculose komt resistentie aan één enkel antibioticum voor.

multiresistentie 1%
Wanneer de tuberculosebacterie **niet meer gevoelig is voor de 2 belangrijkste antibiotica** in de klassieke standaardbehandeling spreken we van multiresistentie. Deze vorm is ernstig maar relatief zeldzaam in België.

7 multiresistente gevallen (MDR) van tuberculose werden gemeld in 2018, wat overeenkomt met 1% van de gevallen van wie het antibiogram gekend is.

De overgrote meerderheid van de gevallen wordt ontdekt op basis van **klachten en symptomen**.

Actieve screening van **risicogroepen** zoals verzoekers om internationale bescherming of gedetineerden leidt tot de opsporing van 7% van alle gevallen.



De belangrijkste symptomen van tuberculose in de longen zijn:


- langdurige hoest
- productieve hoest, soms met bloed
- lichte koorts
- nachtzweeten
- gewichtsverlies
- vermoeidheid



78% van de gevallen werd **met succes behandeld**.

Er worden aanzienlijke inspanningen gedaan om het streefdoel (nl. 85%) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te behalen.

genezen 78%



Tuberculose wordt behandeld door toediening van verschillende antibiotica gedurende minstens 6 maanden. Het is een zeer lange behandeling maar ze is over het algemeen erg doeltreffend

2050
De doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie is om tegen **2050 tuberculose te elimineren**. Hiertoe moet in België de incidentie dalen met 12% per jaar.

Tuberculose vormt nog steeds een probleem van algemene volksgezondheid in België. Adequate middelen zijn nodig om de ziekte verder onder controle te krijgen met het oog op totale eliminatie.

VRGT
Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding
Eendrachtstraat 56, 1050 Brussel
Tel. 02 510 60 90
Fax. 02 511 46 14
info@vrgt.be
www.vrgt.be

FARES
Fonds des Affections Respiratoires
Rue de la Concorde 56, 1050 Bruxelles
Tél. 02 512 29 36
Fax. 02 512 32 73
info@fares.be
www.fares.be