

# TB checklist: cas particulier des jeunes enfants

La checklist n'est pas applicable aux jeunes enfants chez qui il faut être particulièrement attentifs à tout signe de tuberculose **surtout s'il y a eu un contact avec un adulte atteint de TBC contagieuse.**

Symptômes à rechercher chez le jeune enfant	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Fièvre persistante/fébricules répétés (&gt; 10 à 14 jours); surtout sans cause évidente</li><li>• Toux persistante (&gt; 21 jours), sans diagnostic précis, si une autre cause infectieuse est écartée et si le traitement bien conduit n'apporte pas d'amélioration</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecoulement de l'oreille</li><li>• Boiterie</li><li>• Eruption cutanée</li><li>• Perte de poids et/ou retard de croissance</li><li>• Perte d'appétit</li><li>• Diminution de l'activité</li></ul>

- **Etre attentif à ces symptômes et référer au moindre doute**
- En dehors de la forme pulmonaire, les sites les plus fréquemment touchés sont les suivants : ganglions, plèvre, os (colonne vertébrale), abdomen et méninges.
- Les enfants ne sont qu'exceptionnellement contagieux.

Cette check-list est un outil de support développé par le FARES, la VRGT et Fedasil sur base d'un outil de la Ligue Pulmonaire Suisse et de leurs expériences propres. Des traductions en anglais, russe, turc, arabe, dari et pachto (2 langues principales d'Afghanistan) ont été réalisées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Des versions en tigrinya et polonais ont également été éditées. Elles sont téléchargeables sur <http://www.fares.be> (TBC > publications > recommandations)

