

TB checklist bij jonge kinderen

De normale checklist voor volwassenen is niet toepasbaar op jonge kinderen. Bij deze moet men extra waakzaam zijn voor elk signaal van tuberculose, vooral als er een contact is geweest met een volwassene met besmettelijke tuberculose.

| Symptomen die aan TB moeten doen denken bij jonge kinderen | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Aanhoudende koorts/herhaaldelijke koorts (> 10 tot 14 dagen); zonder evidente oorzaak• Aanhoudende hoest (> 21 dagen), zonder precieze diagnose, als een andere infectieuze oorzaak uitgesloten werd en als de goede behandeling ervan geen beterschap geeft | <ul style="list-style-type: none">• Afscheiding uit het oor• Kreupel / mank• Cutane erupties• Gewichtsverlies en/of groeiachterstand• Verlies van eetlust• Verminderde activiteit / passiviteit |

- Waakzaam zijn voor deze symptomen en verwijzen bij de minste twijfel.
- Naast pulmonale vormen zijn de meest voorkomende aangetaste locaties : klieren, pleura, bot (vertebrale kolom) abdomen en hersenvliezen.
- Jonge kinderen zijn slechts zelden zelf besmettelijk.

Deze checklist werd ontwikkeld door de FARES, de VRGT en Fedasil op basis van een instrument van de Ligue Pulmonaire Suisse en hun eigen ervaringen.

